

**PVN Neuzeug - Sierning Allgemeinmediziner GmbH**  
**Josef - Teufelplatz 2**  
**4523 Neuzeug**



Primärversorgungsnetzwerk  
NEUZEUG - SIERNING

**Telefon: 07259 39 364 - 201 | [office@pvn-neuzeug.at](mailto:office@pvn-neuzeug.at)**

## **Merklblatt Zeckenbiss**

Wie entferne ich die Zecke am besten?

---

Entfernen Sie die Zecke vorsichtig mit einer Pinzette indem Sie möglichst hautnah greifen und mit einem einfachen Zug herausziehen. Nicht drehen und kein Öl auftragen!

Es sind Teile der Zecke in der Haut geblieben?

---

Dies kommt häufig vor und ist meist harmlos. In den meisten Fällen stößt der Körper die in der Haut verbliebenen Teile der Zecke ab oder kapselt sie ein. In letzterem Fall kann ein kleiner tastbare Knoten verbleiben, dies hat jedoch keinen Krankheitswert.

Die Haut ist nach dem Zeckenbiss gerötet?

---

Eine Rötung der Haut bei einem Zeckenbiss und auch nach dem Entfernen der Zecke ist aufgrund des Fremdkörpers und der Reizung der Haut häufig. Die Rötung kann auch einige Tage nach dem Entfernen der Zecke bestehen bleiben und ist nicht als Zeichen für eine Borreliose (Wanderröte) zu sehen. Üblicherweise entsteht erst 1 - 3 Wochen nach dem Zeckenstich die für die Borreliose typische kreisrunde Rötung.

.

Keine Zeckenimpfung, was tun?

---

Fall Sie eine aufrechte (alle 5 Jahre aufgefrischte) FSME Impfung haben, ist diesbezüglich nichts weiter zu tun. Dann besteht ein sicherer Schutz gegen FSME

Sollte die letzte Impfung länger her sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt